

Preparación para examen de

# Biopsia Prostática Ecodirigida

Inicia la siguiente preparación un día antes a la programación de tu **BIOPSIA PROSTÁTICA**:

**AMIKACINA:** *Aplica 1 gramo INTRAMUSCULAR, cada 24 horas.*

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>PRIMERA DOSIS</b> | ▪ <b>6PM</b> el <b>día anterior</b> al procedimiento.   |
| <b>SEGUNDA DOSIS</b> | ▪ <b>6PM</b> del <b>mismo día</b> del procedimiento.    |
| <b>TERCERA DOSIS</b> | ▪ <b>6PM</b> al <b>día siguiente</b> del procedimiento. |

**CIPROFLOXACINO:** *Toma 1 tableta de 500mg. VÍA ORAL, cada 12 horas.*

- Inicia el tratamiento el **DÍA ANTERIOR** a tu biopsia prostática.
- Toma 1 tableta cada 12 horas (**8am / 8pm**) por **10 días**.

**ENEMAS EVACUANTES:** *Aplica 2 enemas VÍA RECTAL, retén cada enema por 15 minutos.*

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>PRIMER ENEMA</b>  | ▪ Aplicar en la <b>NOCHE ANTERIOR</b> al procedimiento ( <b>8pm</b> ). |
| <b>SEGUNDO ENEMA</b> | ▪ Aplicar el <b>MISMO DÍA</b> del procedimiento ( <b>5am</b> ).        |

**Después del procedimiento:**

**PARACETAMOL:** *Toma 1 tableta de 500mg. VÍA ORAL, cada 8 horas.*

- Toma 1 tableta de Paracetamol de 500mg **cada 8 horas por 3 días**, condicional al dolor **después** del procedimiento.

## TEN EN CUENTA

- **SUSPENDER la ingesta de:** ASPIRINA, WARFARINA, CLOPIDROGEL o cualquier MEDICAMENTO ANTICOAGULANTE, **7 días ANTES de la biopsia**.
- **Acude en ayunas** el día del procedimiento (**dieta líquida la noche anterior**).



# Recomendaciones después del Procedimiento

- Reposo físico por **24 horas**.
- Reinicia la dieta completa (**evita el ají y condimentos**).
- **NO** relaciones sexuales (**durante al menos 10 días**).

## Podrías presentar los siguientes síntomas:

- Sangrado leve por la orina.
- Sangrado leve por el recto.
- Dolor leve-moderado.



Estos síntomas son **propios al procedimiento** y se resolverán espontáneamente en el transcurso de los días siguientes, **con la medicación indicada**.

## SIGNOS DE ALARMA



- Fiebre (**Temperatura mayor a 39°C**).
- Escalosfríos intensos.



En caso de presentar estos signos de alarma, **ACUDE A LA EMERGENCIA** para su tratamiento oportuno.

**ES OBLIGATORIO VENIR ACOMPAÑADO POR UN FAMILIAR.**